Vorkurs Theoretische Informatik

Induktion und Einführung in die Grammatik

Arbeitskreis Theo-Vorkurs

Mittwoch, 9. Oktober 2024

Fachgruppe Informatik Universität Stuttgart

Aktuelle Folien:

Übersicht

Vollständige Induktion

Idee

Zeige Aussagen der Form:

Für alle $n \in \mathbb{N}$ ***gilt...***

1. Zeige Aussage für das kleinste Element
2. Zeige, dass Aussage auch für das folgende Element gilt.



Idee

Zeige Aussagen der Form:
Für alle $n \in \mathbb{N}$ ***gilt…***

1. Zeige Aussage für das kleinste Element
2. Zeige, dass Aussage auch für das folgende Element gilt.
3. Zeige, dass Aussage auch für das folgende Element gilt.



Idee

Zeige Aussagen der Form:

Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt...

1. Zeige Aussage für das kleinste Element
2. Zeige, dass Aussage auch für das folgende Element gilt.
3. Zeige, dass Aussage auch für das folgende Element gilt.
4. Zeige, dass Aussage auch für das folgende Element gilt.



Idee

Zeige Aussagen der Form:

Für alle $n \in \mathbb{N}$ ***gilt…***

1. Zeige Aussage für das kleinste Element
2. Zeige, dass Aussage auch für das folgende Element gilt.
3. Zeige, dass Aussage auch für das folgende Element gilt.
4. Zeige, dass Aussage auch für das folgende Element gilt.
5. Zeige, dass Aussage auch für das folgende Element gilt.



Idee

Zeige Aussagen der Form:

Für alle $n \in \mathbb{N}$ ***gilt...***

1. Zeige Aussage für das kleinste Element
2. Zeige, dass Aussage auch für das folgende Element gilt.
3. Zeige, dass Aussage auch für das folgende Element gilt.
4. Zeige, dass Aussage auch für das folgende Element gilt.
5. Zeige, dass Aussage auch für das folgende Element gilt.
6. Zeige, dass Aussage auch für das folgende Element gilt.



Idee

Zeige Aussagen der Form:
Für alle $n \in \mathbb{N}$ ***gilt…***

1. Zeige Aussage für das kleinste Element
2. Zeige, dass Aussage auch für das folgende Element gilt.
3. Zeige, dass Aussage auch für das folgende Element gilt.
4. Zeige, dass Aussage auch für das folgende Element gilt.
5. Zeige, dass Aussage auch für das folgende Element gilt.
6. Zeige, dass Aussage auch für das folgende Element gilt.
7. …



Idee

Zeige Aussagen der Form:

Für alle $n \in \mathbb{N}$ ***gilt...***

1. Zeige Aussage für das kleinste Element
2. Zeige, wenn Aussage für beliebiges n gilt, gilt sie auch für dessen Nachfolger, also $n + 1$.



Idee

Zeige Aussagen der Form:

Für alle** $n \in \mathbb{N}$ **gilt...

1. Zeige Aussage für das kleinste Element
2. Zeige, wenn Aussage für beliebiges n gilt, gilt sie auch für dessen Nachfolger, also $n + 1$.
3. $\rightsquigarrow$ Aussage gilt für alle n.



Struktur

Zeige Aussagen der Form:

Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt...

1. Induktionsanfang

   Zeige Aussage für das kleinste Element

2. Induktionsvoraussetzung

   Zeige, unter der Voraussetzung:

   die Aussage gelte für beliebiges n,...

3. Induktionsschritt

   ...dann gilt die Aussage auch für dessen Nachfolger $n + 1$.

4. $\rightsquigarrow$ Aussage gilt für alle $n \in \mathbb{N}$.

Beispiel

$$\sum_{i=0}^{n} (2i+1) = (n+1)^2, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$



Beispiel

Zeigen Sie $\sum_{i=0}^{n}(2i+1) = (n+1)^2, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$

Induktionsanfang (IA)

Zeige Aussage gilt für $n := 0$:

$$\begin{aligned} & \sum_{i=0}^{0}(2i+1) && \overset{!}{=} && (0+1)^2 \\ \iff & 2 \cdot 0 + 1 && \overset{!}{=} && 1^2 \\ \iff & 1 && = && 1 && \checkmark \end{aligned}$$

Beispiel

Zeigen Sie $\displaystyle\sum_{i=0}^{n}(2i+1) = (n+1)^2, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$

Induktionsanfang (IA)

Aussage gilt für $n := 0$, da $\displaystyle\sum_{i=0}^{0}(2i+1) = (0+1)^2.$

Induktionsvoraussetzung (IV)

Ang. Aussage gilt für (ein beliebiges aber festes) $n \in \mathbb{N}$.

Induktionsschritt (IS)

Zeige Aussage gilt für alle $n+1$ unter Nutzung der (IV):

$$\sum_{i=0}^{n+1}(2i+1) \overset{!}{=} ((n+1)+1)^2$$

Beispiel

Induktionsschritt

Zeige Aussage gilt für alle $n + 1$ unter Nutzung der IV:

$$\sum_{i=0}^{n+1} (2i + 1) \stackrel{!}{=} ((n + 1) + 1)^2$$

Induktionsschritt

Zeige Aussage gilt für alle $n+1$ unter Nutzung der IV:

$$\sum_{i=0}^{n+1}(2i+1) \stackrel{!}{=} ((n+1)+1)^2$$

$$\iff \sum_{i=0}^{n}(2i+1) + \sum_{i=n+1}^{n+1}(2i+1) \stackrel{!}{=} (n+2)^2$$

Beispiel

Induktionsschritt

Zeige Aussage gilt für alle $n+1$ unter Nutzung der IV:

$$
\begin{aligned}
& \sum_{i=0}^{n+1}(2i+1) && \overset{!}{=} && ((n+1)+1)^2 \\
\Longleftrightarrow\quad & \sum_{i=0}^{n}(2i+1) + \sum_{i=n+1}^{n+1}(2i+1) && \overset{!}{=} && (n+2)^2 \\
\Longleftrightarrow\quad & \sum_{i=0}^{n}(2i+1) + (2(n+1)+1) && \overset{!}{=} && n^2 + 2\cdot 2n + 2^2
\end{aligned}
$$

Beispiel

Induktionsschritt

Zeige Aussage gilt für alle $n + 1$ unter Nutzung der IV:

$$
\begin{aligned}
& \sum_{i=0}^{n+1} (2i + 1) && \stackrel{!}{=} && ((n + 1) + 1)^2 \\
\iff & \sum_{i=0}^{n} (2i + 1) + \sum_{i=n+1}^{n+1} (2i + 1) && \stackrel{!}{=} && (n + 2)^2 \\
\iff & \sum_{i=0}^{n} (2i + 1) + (2(n + 1) + 1) && \stackrel{!}{=} && n^2 + 2 \cdot 2n + 2^2 \\
\stackrel{IV}{\iff} & (n + 1)^2 + (2(n + 1) + 1) && \stackrel{!}{=} && n^2 + 4n + 4
\end{aligned}
$$

Beispiel

Induktionsschritt

Zeige Aussage gilt für alle $n+1$ unter Nutzung der IV:

$$
\begin{aligned}
& \sum_{i=0}^{n+1}(2i+1) && \stackrel{!}{=} && ((n+1)+1)^2 \\
\iff\; & \sum_{i=0}^{n}(2i+1) + \sum_{i=n+1}^{n+1}(2i+1) && \stackrel{!}{=} && (n+2)^2 \\
\iff\; & \sum_{i=0}^{n}(2i+1) + (2(n+1)+1) && \stackrel{!}{=} && n^2 + 2\cdot 2n + 2^2 \\
\stackrel{IV}{\iff}\; & (n+1)^2 + (2(n+1)+1) && \stackrel{!}{=} && n^2 + 4n + 4 \\
\iff\; & n^2 + 2n + 1^2 + 2n + 2 + 1 && \stackrel{!}{=} && n^2 + 4n + 4
\end{aligned}
$$

Beispiel

Induktionsschritt

Zeige Aussage gilt für alle $n+1$ unter Nutzung der IV:

$$
\begin{aligned}
& \sum_{i=0}^{n+1} (2i+1) && \overset{!}{=} && ((n+1)+1)^2 \\
\iff\; & \sum_{i=0}^{n} (2i+1) + \sum_{i=n+1}^{n+1} (2i+1) && \overset{!}{=} && (n+2)^2 \\
\iff\; & \sum_{i=0}^{n} (2i+1) + (2(n+1)+1) && \overset{!}{=} && n^2 + 2 \cdot 2n + 2^2 \\
\overset{IV}{\iff}\; & (n+1)^2 + (2(n+1)+1) && \overset{!}{=} && n^2 + 4n + 4 \\
\iff\; & n^2 + 2n + 1^2 + 2n + 2 + 1 && \overset{!}{=} && n^2 + 4n + 4 \\
\iff\; & n^2 + 4n + 4 && = && n^2 + 4n + 4
\end{aligned}
$$

Beispiel

Zeigen Sie $\sum_{i=0}^{n}(2i+1) = (n+1)^2, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$

Induktionsanfang (IA)

Aussage gilt für $n := 0$, da $\sum_{i=0}^{0}(2i+1) = 1^2$.

Induktionsvoraussetzung (IV)

Ang. Aussage gilt für (ein beliebiges aber festes) $n \in \mathbb{N}$.

Induktionsschritt (IS)

Aussage gilt für alle $n+1$ unter Nutzung der IV, da

$$\sum_{i=0}^{n+1}(2i+1) = ((n+1)+1)^2$$

$\rightsquigarrow$ Aussage gilt für alle n. $\square$

Denkpause

Aufgaben

Versuche dich an den folgenden Induktionsbeweisen.

Normal

$$\sum_{i=0}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Schwerer

$$\prod_{i=1}^{n} 4^i = 2^{n(n+1)}, \quad \forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$$

Lösungen: normale Aufgabe

Zu zeigen: $\sum_{i=0}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$ gilt für alle $n \in \mathbb{N}$.

Induktionsanfang (IA)

Aussage gilt für $n := 0$, da $\sum_{i=0}^{0} i = 0 = \frac{0(0+1)}{2}$.

Induktionsvoraussetzung (IV)

Ang. Aussage gilt für $n \in \mathbb{N}$.

Induktionsschritt (IS)

Zeige Aussage gilt für alle $n+1$ unter Nutzung der IV:

$$\sum_{i=0}^{n+1} i \stackrel{!}{=} \frac{(n+1)\left((n+1)+1\right)}{2}$$

Lösungen: normale Aufgabe

Induktionsschritt

Zeige Aussage gilt für $n + 1$ unter Nutzung der I.V.:

$$\sum_{i=0}^{n+1} i \overset{!}{=} \frac{(n+1)\left((n+1)+1\right)}{2}$$

Induktionsschritt

Zeige Aussage gilt für $n + 1$ unter Nutzung der I.V.:

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^{n+1} i &\overset{!}{=} \frac{(n+1)\left((n+1)+1\right)}{2} \\ \iff \left(\sum_{i=0}^{n} i\right) + (n+1) &\overset{!}{=} \frac{(n+1)(n+2)}{2} \end{aligned}$$

Lösungen: normale Aufgabe

Induktionsschritt

Zeige Aussage gilt für $n+1$ unter Nutzung der I.V.:

$$\begin{aligned}
& \sum_{i=0}^{n+1} i && \stackrel{!}{=} && \frac{(n+1)\left((n+1)+1\right)}{2} \\
\iff & \left(\sum_{i=0}^{n} i\right) + (n+1) && \stackrel{!}{=} && \frac{(n+1)(n+2)}{2} \\
\iff & \left(\sum_{i=0}^{n} i\right) + (n+1) && \stackrel{!}{=} && \frac{n^2+3n+2}{2}
\end{aligned}$$

Lösungen: normale Aufgabe

Induktionsschritt

Zeige Aussage gilt für $n+1$ unter Nutzung der I.V.:

$$
\begin{aligned}
& \sum_{i=0}^{n+1} i && \stackrel{!}{=} && \frac{(n+1)\left((n+1)+1\right)}{2} \\
\iff & \left(\sum_{i=0}^{n} i\right) + (n+1) && \stackrel{!}{=} && \frac{(n+1)(n+2)}{2} \\
\iff & \left(\sum_{i=0}^{n} i\right) + (n+1) && \stackrel{!}{=} && \frac{n^2+3n+2}{2} \\
\stackrel{IV}{\iff} & \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) && \stackrel{!}{=} && \frac{n^2+3n+2}{2}
\end{aligned}
$$

Induktionsschritt

Zeige Aussage gilt für $n + 1$ unter Nutzung der I.V.:

$$
\begin{aligned}
& \sum_{i=0}^{n+1} i && \stackrel{!}{=} && \frac{(n+1)\left((n+1)+1\right)}{2} \\
\iff & \left(\sum_{i=0}^{n} i\right) + (n+1) && \stackrel{!}{=} && \frac{(n+1)(n+2)}{2} \\
\iff & \left(\sum_{i=0}^{n} i\right) + (n+1) && \stackrel{!}{=} && \frac{n^2+3n+2}{2} \\
\stackrel{IV}{\iff} & \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) && \stackrel{!}{=} && \frac{n^2+3n+2}{2} \\
\iff & \frac{n^2+n}{2} + \frac{2n+2}{2} && \stackrel{!}{=} && \frac{n^2+3n+2}{2}
\end{aligned}
$$

Induktionsschritt

Zeige Aussage gilt für $n+1$ unter Nutzung der I.V.:

$$
\begin{aligned}
& \sum_{i=0}^{n+1} i && \stackrel{!}{=} && \frac{(n+1)\left((n+1)+1\right)}{2} \\
\iff & \left(\sum_{i=0}^{n} i\right) + (n+1) && \stackrel{!}{=} && \frac{(n+1)(n+2)}{2} \\
\iff & \left(\sum_{i=0}^{n} i\right) + (n+1) && \stackrel{!}{=} && \frac{n^2+3n+2}{2} \\
\stackrel{IV}{\iff} & \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) && \stackrel{!}{=} && \frac{n^2+3n+2}{2} \\
\iff & \frac{n^2+n}{2} + \frac{2n+2}{2} && \stackrel{!}{=} && \frac{n^2+3n+2}{2} \\
\iff & \frac{n^2+3n+2}{2} && = && \frac{n^2+3n+2}{2}
\end{aligned}
$$

Zu zeigen: $\sum_{i=0}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$ gilt für alle $n \in \mathbb{N}$.

Induktionsanfang (IA)

Aussage gilt für $n := 0$, da $\sum_{i=0}^{0} i = 0 = \frac{0(0+1)}{2}$.

Induktionsvoraussetzung (IV)

Ang. Aussage gilt für $n \in \mathbb{N}$.

Induktionsschritt (IS)

Zeige Aussage gilt für $n+1$ unter Nutzung der IV:

$$\sum_{i=0}^{n+1} i \stackrel{!}{=} \frac{(n+1)\left((n+1)+1\right)}{2} \text{ gilt für alle } n \in \mathbb{N}$$

$\rightsquigarrow$ Aussage gilt für alle n. $\square$

Lösungen: schwerere Aufgabe

Zu zeigen: $\prod_{i=1}^{n} 4^i = 2^{n(n+1)}$ gilt für alle $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

Induktionsanfang (IA)

Aussage gilt für $n := 1$, da $\prod_{i=1}^{1} 4^i = 4^1 = 4 = 2^2 = 2^{1(1+1)}$.

Induktionsvoraussetzung (IV)

Ang. Aussage gilt für $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

Induktionsschritt (IS)

Zeige Aussage gilt für $n + 1$ unter Nutzung der IV:

$$\prod_{i=1}^{n+1} 4^i \overset{!}{=} 2^{(n+1)((n+1)+1)}$$

Induktionsschritt

Zeige Aussage gilt für $n+1$ unter Nutzung der I.V.:

$$\prod_{i=1}^{n+1} 4^i \overset{!}{=} 2^{(n+1)((n+1)+1)}$$

Lösungen: schwerere Aufgabe

Induktionsschritt

Zeige Aussage gilt für $n+1$ unter Nutzung der I.V.:

$$
\begin{aligned}
& \prod_{i=1}^{n+1} 4^i && \stackrel{!}{=} && 2^{(n+1)((n+1)+1)} \\
\iff & \left(\prod_{i=1}^{n} 4^i\right) \cdot 4^{(n+1)} && \stackrel{!}{=} && 2^{(n+1)(n+2)}
\end{aligned}
$$

Induktionsschritt

Zeige Aussage gilt für $n+1$ unter Nutzung der I.V.:

$$
\begin{aligned}
& \prod_{i=1}^{n+1} 4^i && \stackrel{!}{=} && 2^{(n+1)((n+1)+1)} \\
\Longleftrightarrow\; & \left(\prod_{i=1}^{n} 4^i\right) \cdot 4^{(n+1)} && \stackrel{!}{=} && 2^{(n+1)(n+2)} \\
\stackrel{IV}{\Longleftrightarrow}\; & \left(2^{n(n+1)}\right) \cdot 4^{(n+1)} && \stackrel{!}{=} && 2^{n^2+3n+2}
\end{aligned}
$$

Induktionsschritt

Zeige Aussage gilt für $n+1$ unter Nutzung der I.V.:

$$
\begin{aligned}
& \prod_{i=1}^{n+1} 4^i && \stackrel{!}{=} && 2^{(n+1)((n+1)+1)} \\
\Longleftrightarrow\ & \left(\prod_{i=1}^{n} 4^i\right) \cdot 4^{(n+1)} && \stackrel{!}{=} && 2^{(n+1)(n+2)} \\
\overset{IV}{\Longleftrightarrow}\ & \left(2^{n(n+1)}\right) \cdot 4^{(n+1)} && \stackrel{!}{=} && 2^{n^2+3n+2} \\
\Longleftrightarrow\ & 2^{n^2+n} \cdot 2^{2(n+1)} && \stackrel{!}{=} && 2^{n^2+3n+2}
\end{aligned}
$$

Lösungen: schwerere Aufgabe

Induktionsschritt

Zeige Aussage gilt für $n+1$ unter Nutzung der I.V.:

$$
\begin{aligned}
& \prod_{i=1}^{n+1} 4^i && \stackrel{!}{=} && 2^{(n+1)((n+1)+1)} \\
\iff & \left(\prod_{i=1}^{n} 4^i\right) \cdot 4^{(n+1)} && \stackrel{!}{=} && 2^{(n+1)(n+2)} \\
\stackrel{IV}{\iff} & \left(2^{n(n+1)}\right) \cdot 4^{(n+1)} && \stackrel{!}{=} && 2^{n^2+3n+2} \\
\iff & 2^{n^2+n} \cdot 2^{2(n+1)} && \stackrel{!}{=} && 2^{n^2+3n+2} \\
\iff & 2^{n^2+n} \cdot 2^{2n+2} && \stackrel{!}{=} && 2^{n^2+3n+2}
\end{aligned}
$$

Induktionsschritt

Zeige Aussage gilt für $n+1$ unter Nutzung der I.V.:

$$
\begin{aligned}
& \prod_{i=1}^{n+1} 4^i && \stackrel{!}{=} && 2^{(n+1)((n+1)+1)} \\
\iff & \left(\prod_{i=1}^{n} 4^i\right) \cdot 4^{(n+1)} && \stackrel{!}{=} && 2^{(n+1)(n+2)} \\
\stackrel{IV}{\iff} & \left(2^{n(n+1)}\right) \cdot 4^{(n+1)} && \stackrel{!}{=} && 2^{n^2+3n+2} \\
\iff & 2^{n^2+n} \cdot 2^{2(n+1)} && \stackrel{!}{=} && 2^{n^2+3n+2} \\
\iff & 2^{n^2+n} \cdot 2^{2n+2} && \stackrel{!}{=} && 2^{n^2+3n+2} \\
\iff & 2^{(n^2+n)+(2n+2)} && \stackrel{!}{=} && 2^{n^2+3n+2}
\end{aligned}
$$

Lösungen: schwerere Aufgabe

Induktionsschritt

Zeige Aussage gilt für $n+1$ unter Nutzung der I.V.:

$$
\begin{array}{rlcl}
 & \prod_{i=1}^{n+1} 4^i & \overset{!}{=} & 2^{(n+1)((n+1)+1)} \\
\Longleftrightarrow & \left(\prod_{i=1}^{n} 4^i\right) \cdot 4^{(n+1)} & \overset{!}{=} & 2^{(n+1)(n+2)} \\
\overset{IV}{\Longleftrightarrow} & \left(2^{n(n+1)}\right) \cdot 4^{(n+1)} & \overset{!}{=} & 2^{n^2+3n+2} \\
\Longleftrightarrow & 2^{n^2+n} \cdot 2^{2(n+1)} & \overset{!}{=} & 2^{n^2+3n+2} \\
\Longleftrightarrow & 2^{n^2+n} \cdot 2^{2n+2} & \overset{!}{=} & 2^{n^2+3n+2} \\
\Longleftrightarrow & 2^{(n^2+n)+(2n+2)} & \overset{!}{=} & 2^{n^2+3n+2} \\
\Longleftrightarrow & 2^{n^2+3n+2} & = & 2^{n^2+3n+2}
\end{array}
$$

Lösungen: schwerere Aufgabe

Zu zeigen: $\prod_{i=1}^{n} 4^i = 2^{n(n+1)}$ gilt für alle $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

Induktionsanfang (IA)

Aussage gilt für $n := 1$, da $\prod_{i=1}^{1} 4^i = 4^1 = 4 = 2^2 = 2^{1(1+1)}$.

Induktionsvoraussetzung (IV)

Ang. Aussage gilt für $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

Induktionsschritt (IS)

Zeige Aussage gilt für $n + 1$ unter Nutzung der IV:

$$\prod_{i=1}^{n+1} 4^i \overset{!}{=} 2^{(n+1)((n+1)+1)} \text{ gilt für alle } n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$$

$\rightsquigarrow$ Aussage gilt für alle n. $\square$

Murmelpause

Definition nochmal formaler

$$(\forall n \in \mathbb{N}_{n_0} : P(n)) \iff (P(n_0) \land \forall n \in \mathbb{N}_{n_0} : (P(n) \implies P(n+1)))$$

Definition nochmal formaler

$$(\forall n \in \mathbb{N}_{n_0} : P(n)) \iff (\underbrace{P(n_0)}_{\text{IA}} \land \overbrace{\forall n \in \mathbb{N}_{n_0} : (\underbrace{P(n)}_{\text{IV}} \implies P(n+1))}^{\text{IS}})$$

Definition nochmal formaler

$$(\forall n \in \mathbb{N}_{n_0} : P(n)) \iff (\underbrace{P(n_0)}_{\text{IA}} \wedge \overbrace{\forall n \in \mathbb{N}_{n_0} : (\underbrace{P(n)}_{\text{IV}} \implies P(n+1))}^{\text{IS}})$$

1. **IA:** $n = n_0$

Definition nochmal formaler

$$(\forall n \in \mathbb{N}_{n_0} : P(n)) \iff (\underbrace{P(n_0)}_{\text{IA}} \wedge \overbrace{\forall n \in \mathbb{N}_{n_0} : (\underbrace{P(n)}_{\text{IV}} \implies P(n+1))}^{\text{IS}})$$

1. **IA:** $n = n_0$
2. **IS:** Sei $n \in \mathbb{N}_{n_0}$ beliebig.

Definition nochmal formaler

$$(\forall n \in \mathbb{N}_{n_0} : P(n)) \iff \underbrace{(P(n_0)}_{\text{IA}} \land \overbrace{\forall n \in \mathbb{N}_{n_0} : (\underbrace{P(n)}_{\text{IV}} \implies P(n+1))}^{\text{IS}})$$

1. **IA:** $n = n_0$
2. **IS:** Sei $n \in \mathbb{N}_{n_0}$ beliebig. Ang. es gilt $P(n)$. **(IV)**

Definition nochmal formaler

$$(\forall n \in \mathbb{N}_{n_0} : P(n)) \iff \underbrace{(P(n_0)}_{\text{IA}} \wedge \overbrace{\forall n \in \mathbb{N}_{n_0} : (\underbrace{P(n)}_{\text{IV}} \implies P(n+1))}^{\text{IS}})$$

1. **IA:** $n = n_0$
2. **IS:** Sei $n \in \mathbb{N}_{n_0}$ beliebig. Ang. es gilt $P(n)$. **(IV)**
3. Zeigen, dass $P(n+1)$ gilt, unter Verwendung von $P(n)$ **(IV)**

Aufgabe

Die folgende Induktion zeigt eine seltsame Aussage.

Ist der Beweis korrekt geführt? Was ist passiert?

Sei $A(n)$:= *In einem Wald aus n Bäumen haben alle die selbe Größe.*

Zu zeigen: $A(n)$ gilt für alle $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

Induktionsanfang (IA)

$A(1)$: Aussage gilt für $n := 1$, da ein Baum nur eine Größe haben kann.

Induktionsvoraussetzung (IV)

Ang. $A(n)$ gilt für $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 1$.

Induktionsschritt (IS)

Zeige Aussage gilt für alle $n + 1$ unter Nutzung der IV:

D.h. wir zeigen $A(n + 1)$ = *In einem Wald aus $n + 1$ Bäumen haben alle die selbe Größe.*

Aufgabe

Induktionsschritt (IS)

Wir betrachten einen Wald aus $n + 1$ Bäumen:

$n{+}1$

Wir sondern einen Baum aus und betrachten den Rest. Nach I.V. haben diese alle die selbe Größe.

n

Jetzt sondern wir einen anderen Baum aus.

n

Die übrigen n Bäume haben nach I.V. wieder die selbe Größe.

$n{+}1$

Also haben alle $n + 1$ Bäume die selbe Größe. $\rightsquigarrow A(n)$ gilt für alle n.

Das Problem

Für $A(n+1)$ wird angenommen, dass beide (Teil-)Mengen an n Bäumen mindestens ein gemeinsames Element haben. Sie teilen dann die Größe dieses Elements.

Das Problem ist, dass $A(1) \implies A(2)$ nicht zwangsweise erfüllt sein muss! Somit können wir keine weiteren Folgerungen über $A(n+1)$ mit $n \geq 2$ machen.

Abbildung 1: Beide Bäume erfüllen jeweils $A(1)$, zusammen aber nicht $A(2)$

Denn es gibt ein überlappendes Element erst ab $n+1=3$ Bäumen:



Murmelpause

Grammatiken

Wir können inzwischen Sprachen in Mengenschreibweise darstellen.
Es gibt aber auch weitere Möglichkeiten Sprachen zu definieren.

Wir können Regeln formulieren mit denen wir alle Wörter einer Sprache schrittweise erzeugen können.

Beispiel Worterzeugung

Wir betrachten L = $\{ww^R \mid w \in \{a,b\}^n, n > 0, n \in \mathbb{N}\}$

Hier ist z.B. ww^R = $ababbbbaba \in L$.

w^R ist w rückwärts

Beispiel Worterzeugung

Wir betrachten L = $\{ww^R \mid w \in \{a, b\}^n, n > 0, n \in \mathbb{N}\}$
Hier ist z.B. ww^R = $ababbbbaba \in L$.

1. Wir beginnen mit einer Variablen S.

w^R ist w rückwärts

Beispiel Worterzeugung

Wir betrachten L = $\{ww^R \mid w \in \{a, b\}^n, n > 0, n \in \mathbb{N}\}$
Hier ist z.B. $ww^R = ababbbbaba \in L$.

1. Wir beginnen mit einer Variablen S.
2. Wir formulieren Regeln um S umzuwandeln:

w^R ist w rückwärts

Beispiel Worterzeugung

Wir betrachten L = $\{ww^R \mid w \in \{a, b\}^n, n > 0, n \in \mathbb{N}\}$
Hier ist z.B. $ww^R = ababbbbaba \in L$.

1. Wir beginnen mit einer Variablen S.
2. Wir formulieren Regeln um S umzuwandeln:

$$S \longrightarrow aSa \text{ oder } S \longrightarrow bSb$$

$$\text{oder } S \longrightarrow aa \text{ oder } S \longrightarrow bb$$

w^R ist w rückwärts

Beispiel Worterzeugung

Wir betrachten L = $\{ww^R \mid w \in \{a, b\}^n, n > 0, n \in \mathbb{N}\}$
Hier ist z.B. $ww^R = ababbbbaba \in L$.

1. Wir beginnen mit einer Variablen S.
2. Wir formulieren Regeln um S umzuwandeln:

$$S \longrightarrow aSa \text{ oder } S \longrightarrow bSb$$

$$\text{oder } S \longrightarrow aa \text{ oder } S \longrightarrow bb$$

3. Damit können wir jetzt Wörter aus der Sprache beschreiben:
   z.B.: $ababbbbaba \rightsquigarrow S$

w^R ist w rückwärts

Beispiel Worterzeugung

Wir betrachten L = $\{ww^R \mid w \in \{a, b\}^n, n > 0, n \in \mathbb{N}\}$
Hier ist z.B. $ww^R = ababbbbaba \in L$.

1. Wir beginnen mit einer Variablen S.
2. Wir formulieren Regeln um S umzuwandeln:

$$S \longrightarrow aSa \text{ oder } S \longrightarrow bSb$$
$$\text{oder } S \longrightarrow aa \text{ oder } S \longrightarrow bb$$

3. Damit können wir jetzt Wörter aus der Sprache beschreiben:
   z.B.: $ababbbbaba \rightsquigarrow aSa$

w^R ist w rückwärts

Beispiel Worterzeugung

Wir betrachten L = $\{ww^R \mid w \in \{a,b\}^n, n > 0, n \in \mathbb{N}\}$
Hier ist z.B. $ww^R = ababbbbaba \in L$.

1. Wir beginnen mit einer Variablen S.
2. Wir formulieren Regeln um S umzuwandeln:

$$S \longrightarrow aSa \text{ oder } S \longrightarrow bSb$$

$$\text{oder } S \longrightarrow aa \text{ oder } S \longrightarrow bb$$

3. Damit können wir jetzt Wörter aus der Sprache beschreiben:
   z.B.: $ababbbbaba \rightsquigarrow abSba$

w^R ist w rückwärts

Beispiel Worterzeugung

Wir betrachten L = $\{ww^R \mid w \in \{a, b\}^n, n > 0, n \in \mathbb{N}\}$
Hier ist z.B. ww^R = $ababbbbaba \in L$.

1. Wir beginnen mit einer Variablen S.
2. Wir formulieren Regeln um S umzuwandeln:

$$S \longrightarrow aSa \text{ oder } S \longrightarrow bSb$$

$$\text{oder } S \longrightarrow aa \text{ oder } S \longrightarrow bb$$

3. Damit können wir jetzt Wörter aus der Sprache beschreiben:
   z.B.: $ababbbbaba \rightsquigarrow abaSaba$

w^R ist w rückwärts

Beispiel Worterzeugung

Wir betrachten $L = \{ww^R \mid w \in \{a, b\}^n, n > 0, n \in \mathbb{N}\}$
Hier ist z.B. $ww^R = ababbbbaba \in L$.

1. Wir beginnen mit einer Variablen S.
2. Wir formulieren Regeln um S umzuwandeln:

$$S \longrightarrow aSa \text{ oder } S \longrightarrow bSb$$

$$\text{oder } S \longrightarrow aa \text{ oder } S \longrightarrow bb$$

3. Damit können wir jetzt Wörter aus der Sprache beschreiben:
   z.B.: $ababbbbaba \rightsquigarrow ababSbaba$

w^R ist w rückwärts

Beispiel Worterzeugung

Wir betrachten L = $\{ww^R \mid w \in \{a, b\}^n, n > 0, n \in \mathbb{N}\}$
Hier ist z.B. $ww^R = ababbbbaba \in L$.

1. Wir beginnen mit einer Variablen S.
2. Wir formulieren Regeln um S umzuwandeln:

$$S \longrightarrow aSa \text{ oder } S \longrightarrow bSb$$

$$\text{oder } S \longrightarrow aa \text{ oder } S \longrightarrow bb$$

3. Damit können wir jetzt Wörter aus der Sprache beschreiben:
   z.B.: $ababbbbaba \rightsquigarrow ababbbbaba$

w^R ist w rückwärts

Beispiel Worterzeugung

Wir betrachten $L = \{ww^R \mid w \in \{a,b\}^n, n > 0, n \in \mathbb{N}\}$
Hier ist z.B. $ww^R = ababbbbaba \in L$.

1. Wir beginnen mit einer Variablen S.
2. Wir formulieren Regeln um S umzuwandeln:

$$S \longrightarrow aSa \text{ oder } S \longrightarrow bSb$$

$$\text{oder } S \longrightarrow aa \text{ oder } S \longrightarrow bb$$

3. Damit können wir jetzt Wörter aus der Sprache beschreiben:
   z.B.: $ababbbbaba \rightsquigarrow ababbbbaba$
4. Wir nennen diese Umformungsregeln Produktionsregeln.

w^R ist w rückwärts

Produktionsregeln

Einschränkungen

- *Nichtterminale* werden meist durch Großbuchstaben repräsentiert und müssen durch Produktionsregeln abgeändert werden.
- *Terminale* werden meist durch Kleinbuchstaben repräsentiert und sollten *nicht* durch weitere Produktionsregeln abgeändert werden.
- Mehrere Symbole können auf einen Schlag überführt werden. Dabei sollten die Terminale nicht entfernt oder umsortiert werden.
  z.B. $AB \longrightarrow CD$ ist erlaubt.
  Auch $abAB \longrightarrow BbAa$, aber das gehört sich nicht.

Weitere Beispiele für Produktionen

Aufgaben

Gesucht: Produktionsregeln für die folgenden Sprachen.

$L_1 = \{a\}^*$

Aufgaben

Gesucht: Produktionsregeln für die folgenden Sprachen.

$L_1 = \{a\}^*$
$P = \{S \longrightarrow aS$

Weitere Beispiele für Produktionen

Aufgaben

Gesucht: Produktionsregeln für die folgenden Sprachen.

$L_1 = \{a\}^*$
$P = \{S \longrightarrow aS \mid \varepsilon\}$

Weitere Beispiele für Produktionen

Aufgaben

Gesucht: Produktionsregeln für die folgenden Sprachen.

$L_1 = \{a\}^*$

$P = \{S \longrightarrow aS \mid \varepsilon\}$

$L_2 = \{a, b\}^*$

Weitere Beispiele für Produktionen

Aufgaben

Gesucht: Produktionsregeln für die folgenden Sprachen.

$L_1 = \{a\}^*$

$P = \{S \longrightarrow aS \mid \varepsilon\}$

$L_2 = \{a, b\}^*$

$P = \{S \longrightarrow aS$

Aufgaben

Gesucht: Produktionsregeln für die folgenden Sprachen.

$L_1 = \{a\}^*$

$P = \{S \longrightarrow aS \mid \varepsilon\}$

$L_2 = \{a, b\}^*$

$P = \{S \longrightarrow aS \mid bS$

Weitere Beispiele für Produktionen

Aufgaben

Gesucht: Produktionsregeln für die folgenden Sprachen.

$L_1 = \{a\}^*$

$P = \{S \longrightarrow aS \mid \varepsilon\}$

$L_2 = \{a, b\}^*$

$P = \{S \longrightarrow aS \mid bS \mid \varepsilon\}$

Weitere Beispiele für Produktionen

Aufgaben

Gesucht: Produktionsregeln für die folgenden Sprachen.

$L_1 = \{a\}^*$

$P = \{S \longrightarrow aS \mid \varepsilon\}$

$L_2 = \{a, b\}^*$

$P = \{S \longrightarrow aS \mid bS \mid \varepsilon\}$

$L_3 = \{a^n bbc^m \mid n, m \in \mathbb{N}\}$

Weitere Beispiele für Produktionen

Aufgaben

Gesucht: Produktionsregeln für die folgenden Sprachen.

$L_1 = \{a\}^*$

$P = \{S \longrightarrow aS \mid \varepsilon\}$

$L_2 = \{a, b\}^*$

$P = \{S \longrightarrow aS \mid bS \mid \varepsilon\}$

$L_3 = \{a^n bbc^m \mid n, m \in \mathbb{N}\}$

$P = \{S \longrightarrow ABC,$

Weitere Beispiele für Produktionen

Aufgaben

Gesucht: Produktionsregeln für die folgenden Sprachen.

$L_1 = \{a\}^*$

$P = \{S \longrightarrow aS \mid \varepsilon\}$

$L_2 = \{a, b\}^*$

$P = \{S \longrightarrow aS \mid bS \mid \varepsilon\}$

$L_3 = \{a^n bbc^m \mid n, m \in \mathbb{N}\}$

$P = \{S \longrightarrow ABC,$

$\quad A \longrightarrow aA \mid \varepsilon,$

Weitere Beispiele für Produktionen

Aufgaben

Gesucht: Produktionsregeln für die folgenden Sprachen.

$L_1 = \{a\}^*$

$P = \{S \longrightarrow aS \mid \varepsilon\}$

$L_2 = \{a, b\}^*$

$P = \{S \longrightarrow aS \mid bS \mid \varepsilon\}$

$L_3 = \{a^n bbc^m \mid n, m \in \mathbb{N}\}$

$$
\begin{aligned}
P = \{S &\longrightarrow ABC,\\
A &\longrightarrow aA \mid \varepsilon,\\
B &\longrightarrow bb,
\end{aligned}
$$

Weitere Beispiele für Produktionen

Aufgaben

Gesucht: Produktionsregeln für die folgenden Sprachen.

$L_1 = \{a\}^*$

$P = \{S \longrightarrow aS \mid \varepsilon\}$

$L_2 = \{a, b\}^*$

$P = \{S \longrightarrow aS \mid bS \mid \varepsilon\}$

$L_3 = \{a^n bbc^m \mid n, m \in \mathbb{N}\}$

$$
\begin{aligned}
P = \{S &\longrightarrow ABC, \\
A &\longrightarrow aA \mid \varepsilon, \\
B &\longrightarrow bb, \\
C &\longrightarrow cC \mid \varepsilon\}
\end{aligned}
$$

Aufgaben

Findet Produktionsregeln für die folgenden Sprachen.

Normal

- $L_1 = \{a^{2n} \mid n \in \mathbb{N}\}$
- $L_2 = \{a^n b^n c^m \mid n, m \in \mathbb{N}\}$
- $L_3 = \{uv \mid u \in \{a, b\}^*, v \in \{c, d\}\}$
- $L_4 = \{w \mid |w| = 3, w \in \{a, b, c\}^*\}$

Etwas Schwerer

- $L_5 = \{a^n \mid n \equiv 1 \mod 3\}$
- $L_6 = \{w \mid |w|_a = 3, |w|_b = 1, w \in \{a, b, c\}^*\}$
- $L_7 = \{uv \mid u \in \{\blacktriangleleft, \blacktriangle, \blacktriangleright, \blacktriangledown\}^*, v \in \{\text{STOP}\}\}$
- $L_8 = \{w \mid |w| = 2, w \in \{a, b\}\}$

Lösungen

Alle Lösungen sind Beispiellösungen, es sind auch andere möglich.

- $P_1 = \{S \longrightarrow aaS \mid \varepsilon\}$

Lösungen

Alle Lösungen sind Beispiellösungen, es sind auch andere möglich.

- $P_1 = \{S \longrightarrow aaS \mid \varepsilon\}$
- $P_2 = \{S \longrightarrow AB, A \longrightarrow aAb \mid ab \mid \varepsilon, B \longrightarrow cB \mid \varepsilon\}$

Lösungen

Alle Lösungen sind Beispiellösungen, es sind auch andere möglich.

- $P_1 = \{S \longrightarrow aaS \mid \varepsilon\}$
- $P_2 = \{S \longrightarrow AB, A \longrightarrow aAb \mid ab \mid \varepsilon, B \longrightarrow cB \mid \varepsilon\}$
- $P_3 = \{S \longrightarrow UV, U \longrightarrow aU \mid bU \mid \varepsilon, V \longrightarrow c \mid d\}$

Lösungen

Alle Lösungen sind Beispiellösungen, es sind auch andere möglich.

- $P_1 = \{S \longrightarrow aaS \mid \varepsilon\}$
- $P_2 = \{S \longrightarrow AB, A \longrightarrow aAb \mid ab \mid \varepsilon, B \longrightarrow cB \mid \varepsilon\}$
- $P_3 = \{S \longrightarrow UV, U \longrightarrow aU \mid bU \mid \varepsilon, V \longrightarrow c \mid d\}$
- $P_4 = \{S \longrightarrow XXX, X \longrightarrow a \mid b \mid c\}$

Lösungen

Alle Lösungen sind Beispiellösungen, es sind auch andere möglich.

- $P_1 = \{S \longrightarrow aaS \mid \varepsilon\}$
- $P_2 = \{S \longrightarrow AB, A \longrightarrow aAb \mid ab \mid \varepsilon, B \longrightarrow cB \mid \varepsilon\}$
- $P_3 = \{S \longrightarrow UV, U \longrightarrow aU \mid bU \mid \varepsilon, V \longrightarrow c \mid d\}$
- $P_4 = \{S \longrightarrow XXX, X \longrightarrow a \mid b \mid c\}$
- $P_5 = \{S \longrightarrow a \mid aaaS\}$

Lösungen

Alle Lösungen sind Beispiellösungen, es sind auch andere möglich.

- $P_1 = \{S \longrightarrow aaS \mid \varepsilon\}$
- $P_2 = \{S \longrightarrow AB, A \longrightarrow aAb \mid ab \mid \varepsilon, B \longrightarrow cB \mid \varepsilon\}$
- $P_3 = \{S \longrightarrow UV, U \longrightarrow aU \mid bU \mid \varepsilon, V \longrightarrow c \mid d\}$
- $P_4 = \{S \longrightarrow XXX, X \longrightarrow a \mid b \mid c\}$
- $P_5 = \{S \longrightarrow a \mid aaaS\}$
- $P_6 = \{S \longrightarrow AAAB, AB \longrightarrow BA, A \longrightarrow cA \mid Ac \mid a, B \longrightarrow cB \mid Bc \mid b\}$

Lösungen

Alle Lösungen sind Beispiellösungen, es sind auch andere möglich.

- $P_1 = \{S \longrightarrow aaS \mid \varepsilon\}$
- $P_2 = \{S \longrightarrow AB, A \longrightarrow aAb \mid ab \mid \varepsilon, B \longrightarrow cB \mid \varepsilon\}$
- $P_3 = \{S \longrightarrow UV, U \longrightarrow aU \mid bU \mid \varepsilon, V \longrightarrow c \mid d\}$
- $P_4 = \{S \longrightarrow XXX, X \longrightarrow a \mid b \mid c\}$
- $P_5 = \{S \longrightarrow a \mid aaaS\}$
- $P_6 = \{S \longrightarrow AAAB, AB \longrightarrow BA, A \longrightarrow cA \mid Ac \mid a, B \longrightarrow cB \mid Bc \mid b\}$
- $P_7 = \{S \longrightarrow U$🛑 $\mid$ 🛑$, U \longrightarrow \blacktriangleleft U \mid \blacktriangle U \mid \blacktriangleright U \mid \blacktriangledown U \mid \varepsilon\}$

Lösungen

Alle Lösungen sind Beispiellösungen, es sind auch andere möglich.

- $P_1 = \{S \longrightarrow aaS \mid \varepsilon\}$
- $P_2 = \{S \longrightarrow AB, A \longrightarrow aAb \mid ab \mid \varepsilon, B \longrightarrow cB \mid \varepsilon\}$
- $P_3 = \{S \longrightarrow UV, U \longrightarrow aU \mid bU \mid \varepsilon, V \longrightarrow c \mid d\}$
- $P_4 = \{S \longrightarrow XXX, X \longrightarrow a \mid b \mid c\}$
- $P_5 = \{S \longrightarrow a \mid aaaS\}$
- $P_6 = \{S \longrightarrow AAAB, AB \longrightarrow BA, A \longrightarrow cA \mid Ac \mid a, B \longrightarrow cB \mid Bc \mid b\}$
- $P_7 = \{S \longrightarrow U\text{STOP} \mid \text{STOP}, U \longrightarrow \blacktriangleleft U \mid \blacktriangle U \mid \blacktriangleright U \mid \blacktriangledown U \mid \varepsilon\}$
- $P_8 = \{\} \rightsquigarrow$ Wir brauchen keine Produktionsregeln!

Murmelpause

Formale Notation

Wir beschreiben eine *Grammatik* durch ein geordnetes *Tupel* $G = (V, \Sigma, P, S)$

- V ist die Menge der verwendeten Nichtterminale
- Σ die Menge der Terminale bzw. unser Alphabet
- P ist die Menge der Produktionsregeln
- S ist die Startvariable

Beispiel für L = $\{ww^R \mid w \in \{a, b\}^n,\ n \geq 1\}$

$G = (V, \Sigma, P, S)$ mit

$V = \{S\}$

$\Sigma = \{a, b\}$

$P = \{S \longrightarrow aSa, S \longrightarrow bSb, S \longrightarrow aa, S \longrightarrow bb\}$

bzw. kurz: $P = \{S \longrightarrow aSa \mid bSb \mid aa \mid bb\}$

Knifflige Aufgabe

Totoro will durch das Labyrinth laufen.

Er hat folgende Möglichkeiten:

$\Sigma = \{\blacktriangleleft, \blacktriangle, \blacktriangleright, \blacktriangledown\}$

- Totoro kann nicht auf ein Feld zurücktreten, von dem er gerade kam
- Totoro geht bei jedem Schritt ein Feld in die angegebene Richtung



Abbildung 2: Totoros Problem

Gib eine Grammatik an, welche die Sprache beschreibt, die Totoro durch alle ihm möglichen Wege des Labyrinths führt.

Beispiel



Abbildung 3: Der direkte Weg ist repräsentiert durch das Wort ▼▶▶▶▶▶▶

Lösung



Abbildung 4: Indirekter Weg

Lösung



Abbildung 4: Schlaufe Uhrzeigersinn

Lösung



Abbildung 4: Schlaufe gegen Uhrzeigersinn

Lösung

Eine Möglichkeit:

$$
\begin{aligned}
G &= (V, \Sigma, P, S), \text{ wobei}\\
V &= \{S, A_u, A_r, B_u, B_l\}\\
\Sigma &= \{\blacktriangleleft, \blacktriangle, \blacktriangleright, \blacktriangledown\}\\
P &= \{S \longrightarrow \blacktriangledown A_u \mid \blacktriangledown A_r,\\
&\qquad A_u \longrightarrow \blacktriangleright\blacktriangleright\blacktriangleright\blacktriangleright B_l\\
&\qquad A_r \longrightarrow \blacktriangledown\blacktriangledown\blacktriangleright\blacktriangleright\blacktriangle\blacktriangleright\blacktriangleright\blacktriangle B_u,\\
&\qquad B_l \longrightarrow \blacktriangledown\blacktriangleleft\blacktriangleleft\blacktriangledown\blacktriangleleft\blacktriangleleft\blacktriangle\blacktriangle A_u \mid \blacktriangleright\blacktriangleright,\\
&\qquad B_u \longrightarrow \blacktriangleleft\blacktriangleleft\blacktriangleleft\blacktriangleleft A_r \mid \blacktriangleright\blacktriangleright\}
\end{aligned}
$$



Abbildung 5: Es muss unterschieden werden, ob Totoro von links, rechts oder unten kam

Erinnerung: Totoro kann nicht auf ein Feld zurücktreten, von dem er gerade kam

Ableiten

Wir können durch das Ableiten formal zeigen, dass ein Wort von einer Grammatik erzeugt wird:

Wir betrachten L = $\{ww^R \mid w^R$ ist w rückwärts, $w \in \{a,b\}^n, n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\}$

mit der Grammatik $G = (V, \Sigma, P, S)$, wobei

$V = \{S\}, \Sigma = \{a,b\}, P = \{S \longrightarrow aSa \mid bSb \mid aa \mid bb\}$

Beispiel

Wir zeigen $ww^R = ababbbbaba \in$ L.

$S \Longrightarrow_G aSa \Longrightarrow_G abSba \Longrightarrow_G abaSaba \Longrightarrow_G ababSbaba$

$\Longrightarrow_G ababbbbaba$

$\square$

Denkpause

Aufgaben

Zeige die folgenden Aussagen

Normal

- $G_1 = (\{S\}, \{a\}, P_1, S)$ erzeugt *aaaa*
  mit $P_1 = \{S \longrightarrow aaS \mid \varepsilon\}$
- $G_2 = (\{S, A, B\}, \{a, b, c\}, P_2, S)$ erzeugt *aabbc*
  mit $P_2 = \{S \longrightarrow AB, A \longrightarrow aAb \mid ab \mid \varepsilon, B \longrightarrow cB \mid \varepsilon\}$
- $G_3 = (\{S, U, V\}, \{a, b, c, d\}, P_3, S)$ erzeugt *abac*
  mit $P_3 = \{S \longrightarrow UV, U \longrightarrow aU \mid bU \mid \varepsilon, V \longrightarrow c \mid d\}$
- $G_4 = (\{S, X\}, \{a, b, c\}, P_4, S)$ erzeugt *aac*
  mit $P_4 = \{S \longrightarrow XXX, X \longrightarrow a \mid b \mid c\}$

Denkpause

Aufgaben

Zeige die folgenden Aussagen

Etwas Schwerer

- $G_5 = (\{S\}, \{a\}, P_5, S)$ erzeugt $aaaa$
  mit $P_5 = \{S \longrightarrow a \mid aaaS\}$
- $G_6 = (\{S, A, B\}, \{a, b, c\}, P_6, S)$ erzeugt $cabcacca$
  mit $P_6 = \{S \longrightarrow AAAB, AB \longrightarrow BA, A \longrightarrow cA \mid Ac \mid a, B \longrightarrow cB \mid Bc \mid b\}$
- $G_7 = (\{S, U\}, \{\text{STOP}, \blacktriangleleft, \blacktriangle, \blacktriangleright, \blacktriangledown\}, P_7, S)$ erzeugt $\blacktriangleright\text{STOP}$
  mit $P_7 = \{S \longrightarrow U\text{STOP} \mid \text{STOP}, U \longrightarrow \blacktriangleleft U \mid \blacktriangle U \mid \blacktriangleright U \mid \blacktriangledown U \mid \varepsilon\}$

Lösungen

Alle Lösungen sind Beispiellösungen, es sind auch andere möglich.

- $S \Longrightarrow_{G_1} aaS \Longrightarrow_{G_1} aaaaS \Longrightarrow_{G_1} aaaa$

Lösungen

Alle Lösungen sind Beispiellösungen, es sind auch andere möglich.

- $S \Longrightarrow_{G_1} aaS \Longrightarrow_{G_1} aaaaS \Longrightarrow_{G_1} aaaa$
- $S \Longrightarrow_{G_2} AB \Longrightarrow_{G_2} aAbB \Longrightarrow_{G_2} aabbB \Longrightarrow_{G_2} aabbcB \Longrightarrow_{G_2} aabbc$

Lösungen

Alle Lösungen sind Beispiellösungen, es sind auch andere möglich.

- $S \Longrightarrow_{G_1} aaS \Longrightarrow_{G_1} aaaaS \Longrightarrow_{G_1} aaaa$
- $S \Longrightarrow_{G_2} AB \Longrightarrow_{G_2} aAbB \Longrightarrow_{G_2} aabbB \Longrightarrow_{G_2} aabbcB \Longrightarrow_{G_2} aabbc$
- $S \Longrightarrow_{G_3} UV \Longrightarrow_{G_3} aUV \Longrightarrow_{G_3} abUV \Longrightarrow_{G_3} abaUV \Longrightarrow_{G_3} abaV \Longrightarrow_{G_3} abac$

Lösungen

Alle Lösungen sind Beispiellösungen, es sind auch andere möglich.

- $S \Rightarrow_{G_1} aaS \Rightarrow_{G_1} aaaaS \Rightarrow_{G_1} aaaa$
- $S \Rightarrow_{G_2} AB \Rightarrow_{G_2} aAbB \Rightarrow_{G_2} aabbB \Rightarrow_{G_2} aabbcB \Rightarrow_{G_2} aabbc$
- $S \Rightarrow_{G_3} UV \Rightarrow_{G_3} aUV \Rightarrow_{G_3} abUV \Rightarrow_{G_3} abaUV \Rightarrow_{G_3} abaV \Rightarrow_{G_3} abac$
- $S \Rightarrow_{G_4} XXX \Rightarrow_{G_4} aXX \Rightarrow_{G_4} aaX \Rightarrow_{G_4} aac$

Lösungen

Alle Lösungen sind Beispiellösungen, es sind auch andere möglich.

- $S \Longrightarrow_{G_1} aaS \Longrightarrow_{G_1} aaaaS \Longrightarrow_{G_1} aaaa$
- $S \Longrightarrow_{G_2} AB \Longrightarrow_{G_2} aAbB \Longrightarrow_{G_2} aabbB \Longrightarrow_{G_2} aabbcB \Longrightarrow_{G_2} aabbc$
- $S \Longrightarrow_{G_3} UV \Longrightarrow_{G_3} aUV \Longrightarrow_{G_3} abUV \Longrightarrow_{G_3} abaUV \Longrightarrow_{G_3} abaV \Longrightarrow_{G_3} abac$
- $S \Longrightarrow_{G_4} XXX \Longrightarrow_{G_4} aXX \Longrightarrow_{G_4} aaX \Longrightarrow_{G_4} aac$
- $S \Longrightarrow_{G_5} aaaS \Longrightarrow_{G_5} aaaa$

Lösungen

Alle Lösungen sind Beispiellösungen, es sind auch andere möglich.

- $S \Rightarrow_{G_1} aaS \Rightarrow_{G_1} aaaaS \Rightarrow_{G_1} aaaa$
- $S \Rightarrow_{G_2} AB \Rightarrow_{G_2} aAbB \Rightarrow_{G_2} aabbB \Rightarrow_{G_2} aabbcB \Rightarrow_{G_2} aabbc$
- $S \Rightarrow_{G_3} UV \Rightarrow_{G_3} aUV \Rightarrow_{G_3} abUV \Rightarrow_{G_3} abaUV \Rightarrow_{G_3} abaV \Rightarrow_{G_3} abac$
- $S \Rightarrow_{G_4} XXX \Rightarrow_{G_4} aXX \Rightarrow_{G_4} aaX \Rightarrow_{G_4} aac$
- $S \Rightarrow_{G_5} aaaS \Rightarrow_{G_5} aaaa$
- $S \Rightarrow_{G_6} AAAB \Rightarrow_{G_6} AABA \Rightarrow_{G_6} ABAA \Rightarrow_{G_6} cABAA \Rightarrow_{G_6} caBAA \Rightarrow_{G_6} cabAA \Rightarrow_{G_6} cabcAA \Rightarrow_{G_6} cabcaA \Rightarrow_{G_6} cabcacA \Rightarrow_{G_6} cabcaccA \Rightarrow_{G_6} cabcacca$

Lösungen

Alle Lösungen sind Beispiellösungen, es sind auch andere möglich.

- $S \Longrightarrow_{G_1} aaS \Longrightarrow_{G_1} aaaaS \Longrightarrow_{G_1} aaaa$
- $S \Longrightarrow_{G_2} AB \Longrightarrow_{G_2} aAbB \Longrightarrow_{G_2} aabbB \Longrightarrow_{G_2} aabbcB \Longrightarrow_{G_2} aabbc$
- $S \Longrightarrow_{G_3} UV \Longrightarrow_{G_3} aUV \Longrightarrow_{G_3} abUV \Longrightarrow_{G_3} abaUV \Longrightarrow_{G_3} abaV \Longrightarrow_{G_3} abac$
- $S \Longrightarrow_{G_4} XXX \Longrightarrow_{G_4} aXX \Longrightarrow_{G_4} aaX \Longrightarrow_{G_4} aac$
- $S \Longrightarrow_{G_5} aaaS \Longrightarrow_{G_5} aaaa$
- $S \Longrightarrow_{G_6} AAAB \Longrightarrow_{G_6} AABA \Longrightarrow_{G_6} ABAA \Longrightarrow_{G_6} cABAA \Longrightarrow_{G_6} caBAA \Longrightarrow_{G_6} cabAA \Longrightarrow_{G_6} cabcAA \Longrightarrow_{G_6} cabcaA \Longrightarrow_{G_6} cabcacA \Longrightarrow_{G_6} cabcaccA \Longrightarrow_{G_6} cabcacca$
- $S \Longrightarrow_{G_7} U$ STOP $\Longrightarrow_{G_7} \blacktriangleright U$ STOP $\Longrightarrow_{G_7} \blacktriangleright$ STOP

Wiederholung

Das können wir jetzt beantworten

Vollständige Induktion

- Was ist die Idee der Induktion?
- Welche Schritte hat die Induktion?
- Für welche Aussagen ist die Induktion geeignet?

Das können wir jetzt beantworten

Grammatiken

- Was sind Grammatiken?
- Was ist der Zusammenhang zwischen Grammatiken und Sprachen?
- Was sind Nichtterminale?
- Was sind Terminale?
- Bilden einer Grammatik für gegebene Sprache
- Wie finde ich raus, ob ein Wort von einer Grammatik erzeugt wird?

Noch Fragen?

Glossar

Abk.	Bedeutung	Was?!
$A \subseteq B$	Teilmenge	Alle Elemente aus A sind auch in B enthalten. Dabei können die Mengen auch gleich sein.
$A \subsetneq B$	echte Teilmenge	Alle Elemente aus A sind auch in B enthalten. Jedoch enthält B noch Elemente, die nicht in A enthalten sind. $\implies$ Mengen sind nicht gleich!
$A \subset B$	Teilmenge *oder* echte Teilmenge	Bei manchen Leuten $\subseteq$, bei manchen $\subsetneq$. Mehrdeutig, lieber nicht verwenden!

Lizenz

- Unsere Folien sind frei!
- Jeder darf die Folien unter den Bedingungen der **GNU General Public License v3** (oder jeder späteren Version) weiterverwenden.
- Ihr findet den Quelltext unter `https://www.github.com/FIUS/theo-vorkurs-folien`

Online-Whiteboard